

موارد مصرف: بروتکل عوایض نارسایی مزمن و پریدی یا مانند رگ های واریسی، خارش، احساس سنگینی و ادم در یاهای و درد عضله ساق یا

**موارد مصرف:** بهبود عوارض نارسایی مزمن وریدی پا مانند رگ های واریسی، خارش، احساس سنگینی و ادم در پاهای و درد عضله ساق پا

#### **Other Ingredients:**

Castor oil, Tween 80, Stearyl alcohol, Cetostearyl alcohol, Span 60, Sorbic acid, Disodium edetate, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, B.H.T., Purified water.

سایر اجزاء: روغن کرچک، پلی سوربات، استئاریل الکل، ستو استئاریل الکل، اسپن، سوربیک اسید، دی سدیم ادات، متیل هیدروکسی بنزووات، پروپیل هیدروکسی بنزووات، بی.اچ.تی، آب خالص.

**Each 1 g contains:**

Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed ext. 70 mg عصاره دانه شاه بلوط هندی  
Standardized to 2 g Escin in 100 g (20mg per gram)

در این کرم علاوه بر ترپن های ساپونینی (اسین) مواد مؤثره شامل فلاونوئیدها، پروآنتوسیانیدین ها و تانن ها می باشد.

عصاره شاه بلوط هندی موجود در کرم ونوسیتال باعث افزایش حساسیت وریدها به کانال های کلسیمی، کاهش نفوذپذیری مویرگهای آسیب دیده و افزایش انقباضات وریدها شده و در نهایت منجر به کاهش ادم و تورم می شود. این موجود در عصاره شاه بلوط هندی اثر ضد التهابی قوی مانند گلوكورتیکوئیدها دارد و در عین حال قادر اثرات مهار کننده سیستم ایمنی می باشد. مواد مؤثره موجود در این عصاره سبب بهبود گردش خون و عروق خونی در موضع می شود. در مطالعات بالینی انجام شده، با توجه به عوارض جانبی اندک فرآورده، پذیرش بیمار در طی درمان با فرآورده های موضعی شاه بلوط هندی نسبت به جوراب های واریس، بالاتر تشخیص داده شد. در حالیکه رگ های واریسی با روش هایی مثل لیزر و جراحی درمان می شوند، در مطالعات بالینی متعددی تأثیر بالایی از درمان واریس با مصرف همزمان فرآورده خوراکی (روزانه ۱۰۰ میلی گرم اسین) و موضعی (۲٪ اسین) و حتی فرآورده موضعی به تنها یی به اثبات رسیده است. در یک مطالعه بالینی، بیماران مبتلا به وریدهای واریسی از فرآورده موضعی با ۲٪ اسین دو مرتبه در روز (به مدت ۶ هفته) استفاده کردند و بالای ۸۵ درصد تأثیر خوب تا متوسط گزارش کردند. در مطالعه ای دیگر بهبود قابل ملاحظه ای در درمان واریس و عوارض آن با استفاده توأم فرآورده موضعی و داروی خوراکی طی ۸ هفته مانند تغییر رنگ (آبی شدن) پوست، درد، ادم، خستگی و سنگین. ساق، با مشاهده شد و در می باشد. مدت کاهش، سانت. فرموده های، موضعی. در بینهاده بسیار اعمال، جراحی، و ترمومتر همراه داشتند.

دستور مصرف: مقداری از کرم را در دو تا سه نوبت ، به مدت ۶ هفته برروی پا ، مج و قوزک پا، قسمت داخلی ران ها، پشت زانوها و سایر مناطق درگیر از پایین به بالا ماساژ دهید.برای ادامه درمان بیشتر از ۶ هفته، ۲ هفته توقف بیشینه داشته باشد. در موارد حاد، مصرف هفت مار، داروی خواک، محتوی اسین (قصیر، ونوترا)، و داروی موضعی، توصیه می شود.

تداخلات دارویی

- در مصرف موضعی این فرآورده تداخلی گزارش نشده است.
- در صورت مصرف سایر داروها، با بنشک با داروساز مشوت شود.

تا کنون در مصرف موضعی فرآورده های حاوی عصاره شاه بلوط هندی عارضه ای گزارش نشده است. فقط در افراد حساس به اجزای فرآورده ممکن است عوارض حساسیتی مانند خارش و قرمزی داریم.

عوامل حائز

219 [View video](#)

تاکنون هیله و میله از احتباط و پیشگیری از آتش نشده است.

### صرف در بارداری و شیردهی:

پا توجه به ناکافی بودن اطلاعات در این زمینه، در دوران پارداری و شیردهی تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توجه:

شرایط نکهداری:

Conselho de Segurança do Conselho de Segurança da ONU (UNSC) e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

## References

- 1- BLUMENTHAL , M.(ED).(2003).BRINCKMANN , J.& WOLLSCHLAEGER , B., THE AMERICAN BOTANICAL COUNCIL , THE ABC CLINICAL GUIDE TO HERBS , 250-258.  
2- ZARGARI, A.,MEDICINAL HERBS,(1370),523-529.  
3- ALTERNATIVE MEDICINE REVIEW, 2009;VOL 14N3:278 - 283.  
4- PDR for herbal medicines, Forth edition.(2008), 453 - 457.  
5- Pizzorno J.E, Murray M.T., Text book of Natural Medicine, (2021), 1850-1853,1755  
6- Moshkai, H., et al., Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, (2020), Vol. 45, 2528 - 2529.

مجتمع صنایع دینه ایران

# تولیدکننده فرآورده‌های دارویی، بهداشتی و غذایی (سهامی خاص) **Dineh Iran Industries Complex** The Group of Pharmaceutical, Hygienic & Food Industries(P.J.S)

مشاوره پزشک  
صدای شما  
 021 61018



021 61018

ଦିନେ  
ହିରାନ୍ୟମ